

## POISSONS-PAPILLONS, POISSONS-CHIRURGIENS

**TRAITS CARACTÉRISTIQUES:** 1- Une bande sombre part du milieu de la nageoire dorsale jusqu'à l'arrière de la nageoire anale.

**DESCRIPTION:** le corps est blanc argenté avec toutes les nageoires jaunes à l'exception des nageoires pectorales; une bande sombre en travers de l'œil.

**ABONDANCE ET RÉPARTITION:** peu commun en Floride. Également du Golfe du Mexique au Yucatan et vers le nord jusqu'à la Caroline du Nord.

**HABITAT ET COMPORTEMENT:** le plus commun des poissons-papillons rencontré aux limites de sécurité de plongée, mais aussi parfois signalé dans les 30 mètres près des récifs artificiels de la côte est de la Floride.

**RÉACTIONS AUX PLONGEURS:** un peu méfiant, il s'éloigne lentement s'il est approché. La meilleure manière de l'observer de près est d'attendre tranquillement dissimulé sur sa trajectoire.

**AUTRE NOM:** (USA) Bank Butterflyfish

**TRAITS CARACTÉRISTIQUES:** 1- Long museau pointu. 2- Une bande verticale jaune du haut de la tête au bord inférieur de l'œil (pas au-dessous comme chez les autres poissons-papillons).

**DESCRIPTION:** la partie supérieure du corps est jaunâtre virant à l'orange et s'assombrissant en brun orangé à noir sur la dorsale. La partie inférieure du corps est blanche.

**ABONDANCE ET RÉPARTITION:** commun aux Bahamas et en Caraïbe. Peu commun en Floride du Sud, Également dans le Golfe du Mexique et aux Bermudes.

**HABITAT ET COMPORTEMENT:** en principe solitaire, il habite dans les récifs et les tombants profonds. Il est plus secret que les autres membres de la famille. Il cherche sa nourriture souvent dans des cavités sombres à la recherche d'invertébrés.

**RÉACTIONS AUX PLONGEURS:** méfiant, il plonge dans une anfruosité sombre s'il est approché de trop près. Parfois curieux, il observe ce qui se passe depuis l'orifice de sa cachette.

**AUTRES NOMS:** Papillon Pincette; (USA) Longsnout Butterflyfish.

**TRAITS CARACTÉRISTIQUES:** corps bleu uniforme. 1- Une épine jaune ou blanche sur le pédoncule caudal. JUVÉNILÉ: corps jaune vif uniforme. 2- Intermédiaire: corps et tête bleus. Queue jaune.

**DESCRIPTION:** il peut passer du bleu pastel au violet intense et pâlir ou foncer. Les nageoires dorsale et anale sont ourlées de bleu brillant. Le corps est plus circulaire que celui des autres poissons-chirurgiens. Le passage de la phase Juvénile aux phases intermédiaire et adulte ne dépend pas de la taille et il arrive qu'un juvénile en phase jaune soit plus gros qu'un adulte en phase bleue.

**ABONDANCE ET RÉPARTITION:** abondant à commun en Floride, aux Bahamas et en Caraïbe. Aussi dans le Golfe du Mexique, au nord jusqu'à New York, aux Bermudes et vers le sud jusqu'au Brésil.

**HABITAT ET COMPORTEMENT:** il peut être solitaire, mais il se rencontre le plus souvent en grands bancs, en quête de nourriture parmi les massifs coralliens de faible profondeur. Des chirurgiens noirs et des chirurgiens rayés peuvent se mêler à ces bancs avec d'autres espèces.

**RÉACTIONS AUX PLONGEURS:** un peu méfiant, il tend à garder ses distances. Il s'éloigne lentement s'il est approché de près.


**AUTRES NOMS:** Surgien Bleu, Bayolle; (USA) Blue Tang.

## DISCOÏDAUX, OVALES ET COLORÉS

### PAPILLON AYA

*Prognathodes aya*

Famille: Poissons-papillons  
Chaetodontidae



Taille: 7-13 cm, maxi. 18 cm  
Profondeur: 20-167 m




West Palm Beach, Floride

### PAPILLON PINOCCHIO

*Prognathodes aculeatus*

Famille: Poissons-papillons  
Chaetodontidae



Taille: 5-13 cm, maxi. 9 cm  
Profondeur: 9-60 m




Nassau, Bahamas

### CHIRURGIEN BLEU

*Acanthurus coeruleus*

Famille:  
Poissons-chirurgiens  
Acanthuridae



Taille: 13-25 cm, maxi. 38 cm  
Profondeur: 3-18 m



San Salvador, Bahamas